






- Légende :**
-  Limites du site Natura 2000
 -  Limite des zones tampon (1 km, 500 m, 50 m)
 -  Sensibilité très forte
 -  Sensibilité forte
 -  Sensibilité moyenne



Carte des sensibilités de la boucle de Congis-sur-Thérouanne
ZONE DE PROTECTION SPECIALE FR1112003 "Les Boucles de la Marne"

Source des données : DRIEE Ile-de-France, AEV Ile-de-France, Ornithologues bénévoles des Boucles de la Marne.
 Fond cartographique numérique : BD Scan 25© IGN

Conception - réalisation : DDT 77/SEPR/PFCPMN - AEV Ile-de-France
 Date : Décembre 2012 Échelle : 1/1200



Secteurs de la boucle de Congis-sur-Thérrouanne

| Secteurs | Sensibilité du secteur | Espèces d'intérêt communautaire présentes | Observations |
|--|------------------------|---|---|
| <p>C1 <i>Secteur au sud de la boucle</i></p> <p>C2 <i>Secteur de la zone tampon au nord de la boucle</i></p> | Très forte | Œdicnème criard | Espèce assez rare relativement localisée en Ile-de-France qui utilise ces deux secteurs pour nidifier. L'enjeu est très important. |
| <p>C3 <i>Secteurs situés dans la partie centre et nord de la boucle, au dessus des plans d'eau</i></p> | Forte | Œdicnème criard | Espèce assez rare relativement localisée en Ile-de-France pour laquelle ce secteur constitue un habitat potentiel. |
| <p>C4 <i>Secteur boisé du nord de la boucle, situé pour majeure partie en site</i></p> | Forte | Bondrée apivore | Espèce dont la reproduction est incertaine dans le site Natura 2000 mais pour laquelle ce secteur constitue une aire de reproduction potentielle. |
| | | Pic noir | L'espèce utilise le secteur en recherche alimentaire. L'enjeu est faible sur ses aires de nourrissage. |
| | | Milan noir | Espèce rare en Ile-de-France où l'on trouve peu de couples. L'espèce utilise ce secteur pour se reproduire. |
| <p>C5 <i>Secteur nord ouest de la boucle</i></p> | Moyenne | Bondrée apivore | Espèce dont la reproduction est incertaine dans le site Natura 2000 mais pour laquelle ce secteur constitue une aire de reproduction potentielle. |
| | | Pic noir | L'espèce utilise le secteur en recherche alimentaire. L'enjeu est faible sur ses aires de nourrissage. |
| | | Martin-Pêcheur | Espèce non menacée en France, assez rare en Ile-de-France. Son état est favorable dans le site Natura 2000. Ce secteur constitue un habitat potentiel pour l'espèce. |
| | | Milan noir | Espèce rare en Ile-de-France, peu de couples. Le secteur constitue un habitat favorable ou susceptible de devenir favorable pour ce rapace. |
| <p>C6 <i>La Marne et ses berges, en site et en zone tampon</i></p> | Moyenne | Sterne pierregarin | L'espèce utilise le secteur en recherche alimentaire. L'enjeu est faible sur ses aires de nourrissage. |
| | | Martin-Pêcheur | Espèce non menacée en France, assez rare en Ile-de-France. Son état est favorable dans le site Natura 2000. Ce secteur constitue un habitat potentiel pour l'espèce. |
| | | Milan noir | Espèce rare en Ile-de-France, peu de couples. Ce secteur constitue un habitat favorable ou susceptible de devenir favorable pour ce rapace. |
| <p>C7 <i>Roselières bordant les étangs C9</i></p> | Très forte | Blongios nain | Espèce à valeur patrimoniale importante et rare en Ile-de-France. Ce secteur est composé d'habitats potentiels ou susceptibles de devenir favorable pour cette espèce qui y a été observée avant 2009. |
| | | Butor étoilé | Espèce hivernante rare en Ile-de-France, disparue en tant que nicheur dans la région. Le secteur représente un habitat potentiel de l'espèce. Le Butor étoilé y est observé en période d'hivernage. |
| | | Gorgebleue à miroir | Espèce à valeur patrimoniale forte. Le site des Boucles de la Marne est le seul site Natura 2000 abritant une population francilienne. L'espèce niche dans cette zone. De plus, ce secteur est constitué de plusieurs habitats potentiels pour la Gorgebleue à miroir ainsi que des habitats où elle a été observée avant 2009. |
| <p>C8 <i>Étang du nord est de la boucle</i></p> | Très forte | Butor étoilé | Espèce hivernante rare en Ile-de-France, disparue en tant que nicheur dans la région. Le secteur représente un habitat potentiel de l'espèce. Le Butor étoilé y est observé en période d'hivernage. |
| | | Sterne pierregarin | Espèce à forte valeur patrimoniale dont les habitats de reproduction sont peu représentés en Ile-de-France et dont la nidification est avérée dans ce secteur. |

| | | | |
|--|----------------|------------------------------|---|
| C9 <i>Étangs à l'ouest et à l'est de la boucle</i> | Moyenne | Sterne pierregarin | Secteur utilisé comme aire d'alimentation par l'espèce. L'enjeu est faible sur ses aires de nourrissage. |
| C10 <i>Large secteur de la partie ouest de la boucle</i> | Forte | Sterne pierregarin | Espèce à forte valeur patrimoniale dont les habitats de reproduction sont peu représentés en Ile-de-France et menacés par le dérangement lié au public. Ce secteur constitue un habitat favorable pour cette espèce qui l'utilise déjà comme aire de nourrissage. |
| | | Mouette mélanocéphale | Espèce à forte valeur patrimoniale dont les habitats de reproduction sont peu représentés en Ile-de-France et pour laquelle ce secteur constitue un habitat favorable. |
| | | Œdicnème criard | Espèce assez rare relativement localisée en Ile-de-France. Ce secteur constitue un habitat potentiel pour cet oiseau qui y a été observé avant 2009. |
| | | Gorgebleue à miroir | Espèce à valeur patrimoniale forte. Le site des Boucles de la Marne est le seul site Natura 2000 abritant une population francilienne. Ce secteur constitue un habitat potentiel pour l'espèce. |
| C11 <i>Secteur du sud de la boucle</i> | Moyenne | Milan noir | Espèce rare en Ile-de-France, peu de couples. Le secteur constitue un habitat potentiel pour ce rapace. |
| C12 <i>Secteurs en site, au nord et à l'est de la boucle</i> | Moyenne | X | Secteurs conservant une sensibilité car à l'intérieur du périmètre du site Natura 2000. |